

## Lesiones más frecuentes en la 3<sup>a</sup> Edad

Lesiones por presión

	Nivel de exudado	Prevención/Tratamiento
	Solución	
Categoría I: eritema no blanqueable Alteración observable en la piel íntegra, relacionada con la presión, que se manifiesta por un eritema cutáneo que no palidece al presionar; en pieles oscuras, puede presentar tonos rojos, azules o morados.		Mepilex® Border Flex Oval
Categoría II: úlcera de espesor parcial Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis, dermis o ambas. Úlcera superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial.		Mepilex® Border Flex Oval
Categoría III: pérdida completa del grosor de la piel Pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo, que puede extenderse hacia abajo pero no por la fascia subyacente.		Mepilex® Border Flex Oval + Exufiber®
Categoría IV: pérdida total del espesor de los tejidos Pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis del tejido o lesión en músculo, hueso o estructuras de sostén (tendón, cápsula articular, etc.).		Mepilex® Border Flex Oval
LPP no estabilizable Profundidad desconocida. Pérdida de tejido de espesor total, en la que la base de la úlcera está cubierta por desecación (amarillo, tostado, gris, verde o marrón) y/o escara (bronceada, marrón o negra) en el lecho de la herida.		Mepilex® Border Flex Oval
Sospecha de lesión de tejidos profundos: Profundidad desconocida. Área localizada de color púrpura o granate de piel intacta descolorida o ampolla llena de sangre debido al daño del tejido blando subyacente por presión y/o cizallamiento.		Mepilex® Border Flex Oval

Desgarros cutáneos

	Tratamiento		
	Solución	Si hay infección	Fijación/Protección
Piel en riesgo La piel de las personas mayores es más vulnerable y propensa a sufrir desgarros cutáneos	Epaderm® Cream		
Tipo 1: Sin pérdida de tejido Desgarro lineal o colgajo que puede volverse a colocar para cubrir el lecho de la herida <sup>1</sup>	Mepilex® Up	Mepilex® Ag	Tubifast®
Tipo 2: Pérdida parcial del tejido Pérdida parcial de colgajo, que no puede volverse a colocar para cubrir el lecho de la herida <sup>1</sup>	Mepilex® Up o Mepilex® Border Flex Oval	Mepilex® Ag	Tubifast®
Tipo 3: Pérdida total del tejido Pérdida total del colgajo que deja expuesto todo el lecho de la herida <sup>1</sup>	Mepilex® Up o Mepilex® Border Flex Oval	Mepilex® Ag	Tubifast®

Úlceras vasculares

	Tratamiento		
	Solución	Si hay infección	Fijación/Protección
Úlceras venosas	Mepilex® Up o Mepilex® Border Flex Oval + Exufiber®	Mepilex® Ag	Tubifast®
Úlceras arteriales	Mepilex® Up o Mepilex® Border Flex Oval	Mepilex® Ag	Tubifast®

## Soluciones para el tratamiento de heridas

Productos*	Tam. cm	Código Orion	Tipo de lesión							
			Cuidado de la piel	Lesiones por humedad	Prevención UPP	Tratamiento UPP	Desgarros cutáneos	Úlceras venosas	Úlceras arteriales	
<b>Mepilex® Border Flex Oval</b>	15 x 19	<b>908423</b>								
<b>Exufiber®</b>	10 x 10	<b>908497</b>								
<b>Mepilex® Up</b>	15 x 15	<b>908430</b>								
<b>Mepilex® Ag</b>	12,5 x 12,5	<b>908632</b>								

Más información en [www.molnlycke.es](http://www.molnlycke.es)