



Mehr Nachhaltigkeit
für Ihre Patienten,
Ihr Budget
und unsere Umwelt.

Mepilex® Border Post-Op



Mölnlycke®

Kleine Veränderungen mit grossen Auswirkungen

Wir wissen, wie problematisch medizinischer Abfall sein kann. Er ist schädlich für die Umwelt und erzeugt Kosten, die das Budget belasten. Die Menge an Abfall, die bei jedem Verbandwechsel entsteht, mag auf den ersten Blick nicht so groß erscheinen. Wenn man jedoch die gesamte Zeit bis zum Abheilen der Wunde betrachtet, kann einiges zusammenkommen. Anders mit Mepilex® Border Post-Op.

Mepilex® Border Post-Op kann bis zu 14 Tage auf der Wunde verbleiben.¹

Durch die lange Tragedauer von Mepilex® Border Post-Op ist bei den meisten Patienten bis zu zwei Wochen¹ kein Verbandwechsel erforderlich. Dies bedeutet im Umkehrschluss: kein zusätzlicher Materialbedarf und kein medizinischer Abfall.

Mepilex® Border Post-Op kann die Menge an medizinischem Abfall im Zusammenhang mit Verbänden erheblich reduzieren.

Herkömmliche Verbände werden häufig alle paar Tage oder sogar täglich gewechselt. Zusätzlich benötigen Patienten, die duschen möchten, bei konventionellen Verbänden oft weiteres Material, um die Wundauflage vor dem Nasswerden zu schützen. Mit Mepilex® Border Post-Op ist dies nicht notwendig.

Da Mepilex® Border Post-Op 14 Tage lang auf der Wunde verbleiben kann, unterstützt die Wundauflage eine unge störte Heilung, reduziert das Kontaminationsrisiko^{1,3-8} und spart Zeit und Ressourcen.^{4,5} All das führt zu einer besseren Versorgung der Patienten und viel weniger Abfall.



Über 100 Experten aus ganz Europa, Asien, dem nahen Osten und Afrika haben die aktuell weltweit gültigen Meinungen zur Pflege von Inzisionen diskutiert. Nach 12 internationalen Konsenstreffen zwischen 2019 und 2025 einigten sie sich auf zwei grundlegende Prinzipien:

1. Postoperative Verbände sollten nur dann gewechselt werden, wenn es klinisch notwendig ist, um Kontamination und Kosten zu reduzieren und die Heilung zu fördern.

2. Die ideale postoperative Wundversorgung sollte sechs zentrale Anforderungen an Schutz, Komfort und Leistung erfüllen:

- ✓ Gute Haftung
- ✓ Flexibilität
- ✓ Duschfestigkeit
- ✓ Kein Hohlraum zwischen Wundbett und Wundverband
- ✓ Schutz der Haut
- ✓ Gute Absorption



**Führende
Chirurgen legen
klare Standards
fest.**



Hier erhalten Sie
das vollständige
Konsensuspapier.

Mepilex® Border Post-Op erfüllt diese sechs Anforderungen an einen postoperativen Wundverband:

- ✓ Flexibel und komfortabel³⁻⁵
- ✓ Optimale Haftung¹
- ✓ Absorbiert und speichert Flüssigkeit sehr gut^{1,4, 5}
- ✓ Duschfestigkeit⁶
- ✓ Minimiert Haut- und Wundschäden³⁻⁵
- ✓ Reduziert die Ansammlung von Exsudat auf der Haut (vollflächige Safetac® Beschichtung vergrößert die haftende Auflagefläche)^{3,4}



Nachhaltige Gesundheitsversorgung

Nachhaltigkeit ist eine strategische Priorität für Mölnlycke und wir arbeiten daran, zu einem weltweit führenden Anbieter im Bereich nachhaltiger Gesundheitsversorgung zu werden. 2025 erhielt Mölnlycke® die Platin-Medaille für Nachhaltigkeit von EcoVadis, einem führenden Lösungsanbieter für die Überwachung der Nachhaltigkeit in globalen Lieferketten.

Weniger Verbandwechsel führen zu einem geringeren Materialbedarf, weniger medizinischem Abfall und reduzierten Kosten. So handeln Sie nachhaltig.



Referenzen: 1. Van Overschelde P. et al. Undisturbed wound healing: a single centre retrospective study investigating patient reported outcomes and clinical validity of extended dressing wear time for incisional healing following orthopaedic surgery, the ARCTIS study. Journal of Wound Care, 2024. 2. Sandy-Hodgetts K., et al. Incision care and dressing selection in surgical wounds: Findings from a series of international meetings. Wounds International, 2022. 3. Beele H. et al. A prospective randomized controlled clinical investigation comparing two post-operative wound dressings used after elective hip and knee replacement; Mepilex® Border Post-Op versus Aquacel® Surgical. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 2020. 4. Zarghooni K. et al. Is the use of modern versus conventional wound dressings warranted after primary knee and hip arthroplasty? Acta Orthopaedica Belgica, 2015. 5. Bredow J. et al. Evaluation of Absorbent Versus Conventional Wound Dressing. Eine randomisierte kontrollierte Studie in der Orthopädie. Deutsches Ärzteblatt International, 2018. 6. Southern K et al. Compliance with the ISWCAP checklist in a THR ERAS pathway – A snapshot audit. Clinical Nutrition, 2023. 7. External test at Nelson Laboratories (viral penetration test), Study Report 1064846-S01. 8. Statement towards ASTM F 1671 (viral penetration test), PD- 404335

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.com/de-at

Mölnlycke Health Care GmbH, Obere Donaustraße 25, 1020 Wien. Tel +43 1 278 85 42-0. Fax +43 1 278 85 42-199. info.at@molnlycke.com. Die Namen Mölnlycke Health Care und das Safetac Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2026 Mölnlycke Health Care.
Alle Rechte vorbehalten. DWC0166 / Stand: Juni 2026