

Granudacyn® – War da was?



Granudacyn® Wundspüllösung & Gel kann (fast) alles! Was kann Ihre Spüllösung? Machen Sie den Vergleich.

Was macht Granudacyn® einzigartig?

- Gewebeverträglich: Kein Brennen, keine Zellschädigung – muss nicht ausgespült werden
- Langzeitanwendung: Kann uneingeschränkt eingesetzt werden
- Effektive Spülung: Reduziert Zelltrümmer und Keime mechanisch
- Biokompatibel: Auch für empfindliches Gewebe geeignet, keine Neutralisation nötig¹
- Geruchsreduktion: Weniger Wundgeruch bei bakterieller Besiedlung²
- Breites Anwendungsspektrum: Haut, Schleimhaut, Knorpel, Knochen, Sehnen, Fisteln, intraoperativ
- HOCl/NaOCl-Konservierung: Gewährt Sicherheit und Reinheit³
- Lange Haltbarkeit: 60 Tage (Lösung) / 90 Tage (Gel) nach Öffnung
- Förderung der natürlichen Wundheilung: Feuchtes Wundmilieu
- M.O.I.S.T.-Konzept-konform: Unterstützt alle Aspekte des Konzepts zur Lokaltherapie chronischer Wunden
- Kombinierbar mit NPWT (Unterdruck-Wundtherapiesystem) und Mölnlycke® Wundverbänden



In Kombination und unter Berücksichtigung aller Eigenschaften, Indikationen und Kontraindikationen ist Granudacyn® die Lösung für fast alle Wunden!

Effektiv. Sicher. Wirksam.


Mölnlycke®

Wo kann Granudacyn® eingesetzt werden?*

- ✓ Akute Wunden
- ✓ Chronische Wunden
- ✓ Verbrennungen 1. bis 2. Grades
- ✓ Chirurgische Wunden (intra- und postoperativ)
- ✓ Fisteln & Abszesse
- ✓ Mund- und Ohrbereich
- ✓ Weichteilverletzungen, sowie freiliegende Knochen und Sehnen
- ✓ Infizierte & kontaminierte Wunden
- ✓ Wunden unter NPWT (Unterdruck-Wundtherapiesystem)



* siehe auch IFU (Gebrauchsanweisung) für weitere Informationen

Anwendungsgebiete, auch bei Kontraindikationen für OCT* oder PHMB*

Aktuelle Expertenempfehlung für den differenzierten Einsatz einer antiseptischen Wundtherapie:

Indikation	Antiseptischer Wirkstoff	
	1. Wahl	2. Wahl
Kritisch kolonisierte und Infektionsgefährdete Wunden	PHMB*	NaOCl*/HOCl*, Silber, OCT*/PE*
Verbrennungswunden	PHMB*	NaOCl*/HOCl*
Biss-, Stich-, Schusswunden	PVP-Iod*	OCT*/PE*
MRE-kolonisierte oder infizierte Wunden	OCT*/PE*	OCT*, PHMB*, Silber
Dekontamination akuter und chronischer Wunden	NaOCl*/HOCl*, PHMB*, Octenidin	OCT*/PE*
Peritonealspülung	NaOCl*/HOCl*	-
Wunden mit fehlender Abflussmöglichkeit	NaOCl*/HOCl*	-

Kramer A, Dissemont J, Willy C et al.: Auswahl von Wundantiseptika: Aktualisierung des Expertenkonsensus 2018. Wundmanagement 2019

* Abkürzungen: OCT Octenidin; OCT/PE Octenidin+ Phenoxyethanol; PHMB Polihexanid; NaOCl Natriumhypochlorit; HOCl hypochlorige Säure; PVP Polyvinylpyrrolidon

Granudacyn® Sortiment

Artikelnummer	Pharmazentralnr.	Artikelbezeichnung	Größe	Stück Karton	Stück Packung
Wundspüllösungen					
36 01 10	5353743	Granudacyn Wundspüllösung 50 ml	50 ml	20	1
36 01 11	5353766	Granudacyn Wundspüllösung 250 ml	250 ml	15	1
36 01 00	5562168	Granudacyn Wundspüllösung 250 ml Spray	250 ml	15	1
36 01 01	5353772	Granudacyn Wundspüllösung 500 ml	500 ml	12	1
36 01 02	5353789	Granudacyn Wundspüllösung 1000 ml	1000 ml	6	1
36 01 03	5353795	Granudacyn Wundspüllösung NPWT 500 ml	500 ml	12	1
36 01 04	5353803	Granudacyn Wundspüllösung NPWT 1000 ml	1000 ml	6	1
Gele					
36 01 07	5353714	Granudacyn Wundgel 50 g	50 g	12	1
36 01 12	5353720	Granudacyn Wundgel 100 g	100 g	12	1
36 01 13	5355587	Granudacyn Wundgel 200 g	200 g	15	1



Überzeugen Sie sich selbst!
QR-Code scannen und weitere Informationen zu Granudacyn erhalten!

Referenzen: 1. Severing AL, Rembe JD, Koester V, Stuermer EK. Safety and efficacy profiles of different commercial sodium hypochlorite/hypochlorous acid solutions (NaClO/ HClO): antimicrobial efficacy, cytotoxic impact and physicochemical parameters in vitro Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Volume 74, Issue 2, February 2019, Pages 365–372. 2. Efficacy and safety of neutral pH superoxidized solution in severe diabetic foot infections - Fermin R Martiñez-De Jesu's, Antonio Ramos-De la Medina, Jose' Mari aRemes-Troche, David G Armstrong, Stephanie C Wu, Jose Luis Lazaro Martinez, Juan V Benoit-Montesinos-International Wound Journal. 3. RDS 005-0414, ZLG, Anleitung für die Festlegung von Mindestkriterien zur mikrobiologischen Reinheit von Medizinprodukten.

Weitere Informationen finden Sie unter molnlycke.com/de-at

Mölnlycke Health Care GmbH, Obere Donaustrasse 25, 1020 Wien, Tel +43 1 278 85 42-0, Fax +43 1 278 85 42-199, info.at@molnlycke.com.

Die Namen Mölnlycke Health Care und das Safetac Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2026 Mölnlycke Health Care. Alle Rechte vorbehalten. CH-DWC0319

