


LE SAVIEZ-VOUS ?



LA PEAU EST PORTEUSE DE GERMES

SUSCEPTIBLES DE CAUSER DES
INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE¹



11 PATIENTS SUR 100

DÉVELOPPENT UNE INFECTION
DU SITE OPÉRATOIRE AU COURS
DE LEUR HOSPITALISATION²



20 À 30 %

DES INFECTIONS DU SITE
OPÉRATOIRE PEUVENT ÊTRE
ÉVITÉES³



HIBIWASH® EST SANS PARFUM

INCOLORE ET SANS TRACES
D'HUILE DE SOJA

PRÉVENTION DES ISO

EXPLICATION DES INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE (ISO)

Le terme ISO désigne une infection qui survient sur la peau ou les tissus sous-jacents au niveau du site opératoire. Les ISO peuvent prolonger votre séjour à l'hôpital de six jours et demi et peuvent avoir un impact grave sur votre santé et votre qualité de vie.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

Bonne nouvelle : vous pouvez contribuer à réduire le risque d'infection à l'aide d'un lavage soigneux de la peau avant et après toute intervention avec la solution antiseptique pour le corps Hibiwash®.

Vous pouvez contribuer à réduire le risque
d'ISO de 11 sur 100.

Together let's move towards zero.



HIBIWASH®, PROTECTION GARANTIE


Hibiwash® est un nouveau nettoyant antimicrobien pour le visage et le corps entier. Il est spécialement formulé pour se lier à la surface de votre peau et en prendre soin tout en détruisant les germes, avant et après la chirurgie.

Il contient 4% de gluconate de chlorhexidine qui forme un revêtement protecteur capable d'éliminer 94% des germes présents sur votre corps. Efficace dès la première utilisation, il agit pendant plusieurs heures.^{5,6}



HIBIWASH® SE LIE À LA
PEAU ET EN PREND SOIN

POURQUOI UTILISER HIBIWASH® ?



EFFICACE

TROIS DOUCHES AVEC UNE SOLUTION À 4% DE GLUCONATE DE CHLORHEXIDINE DIMINUENT PAR 20 LE NOMBRE DE GERMES SUR LA PEAU.⁷



ACTION RAPIDE

HIBIWASH® FORME UNE COUCHE PROTECTRICE QUI ÉLIMINE LES GERMES IMMÉDIATEMENT APRÈS L'APPLICATION.⁸



ACTION DURABLE

VOUS ÊTES PROTÉGÉ PENDANT DES HEURES APRÈS UTILISATION.⁹




DOUX

HIBIWASH® EST RICHE EN ÉMOLLIENTS ET DOUX POUR LA PEAU, MÊME EN UTILISATION QUOTIDIENNE.

UTILISATION D'HIBIWASH POUR LE CORPS ENTIER

HUIT ÉTAPES POUR UNE PEAU Saine ET PROTÉGÉE


Utilisez environ 25 ml d'Hibiwash pour la toilette corporelle. Recouvrez bien tout le corps d'Hibiwash® afin de détruire efficacement les micro-organismes.




ÉTAPE 1 : Rincez-vous puis fermez le robinet de la douche.



ÉTAPE 2 : Lavez-vous le visage avec Hibiwash® non dilué, en particulier autour du nez, en évitant les narines, les yeux et les oreilles.




ÉTAPE 3 : Lavez-vous les aisselles avec les mains du haut vers le bas.




ÉTAPE 4 : Lavez ensuite tout le corps et les jambes, en insistant dans la région de l'aîne.

Aidez-nous à réduire le risque de 11 pour cent d'infections du site opératoire. Hibiwash® est un nettoyant antimicrobien puissant pour réduire le risque d'infection et doux pour la peau. Un produit facile d'emploi qui prépare au mieux à l'intervention chirurgicale.


Together let's move towards zero.



ÉTAPE 5 : Après avoir lavé toutes ces zones stratégiques, rincez-vous sous la douche.



ÉTAPE 6 : Répétez maintenant les étapes 2 à 5, cette fois en commençant par les cheveux.



ÉTAPE 7 : Une fois que vous avez fini de laver toutes ces zones importantes, rincez-vous sous la douche.



ÉTAPE 8 : Après le rinçage final, séchez-vous soigneusement avec une serviette propre et mettez des vêtements propres.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Hibiwash® est un médicament. Lisez toujours attentivement l'étiquetage et la notice, consultez votre médecin, votre infirmier·ère votre pharmacien·ne et suivez le protocole de l'hôpital. Veuillez vous adresser à votre personne de contact chez Mölnlycke pour obtenir le résumé des caractéristiques du produit.

CONTRE-INDICATIONS/NE PAS UTILISER

Hibiwash® contient du gluconate de chlorhexidine à 4 % p/v. Si vous êtes allergique au gluconate de chlorhexidine ou à tout autre ingrédient de ce médicament, n'utilisez pas ce produit.

AVERTISSEMENTS

Tenir à l'écart des yeux et du nez, et éviter tout contact avec le cerveau, les méninges, l'oreille moyenne, la bouche et les autres muqueuses. Pour usage externe uniquement. Ne pas ingérer ce médicament. En cas de contact accidentel avec les yeux ou les oreilles, il est recommandé de rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Chez les patients présentant un traumatisme crânien, une lésion de la moelle épinière ou une perforation du tympan, le bénéfice de l'utilisation pour la préparation préopératoire doit être évalué au regard du risque de contact. Hibiwash® ne doit pas être utilisé en cas de plaies profondes et étendues. Ne pas injecter ou utiliser dans les cavités corporelles. Éliminer tout matériel, champ ou blouse imprégné avant de procéder à l'intervention. Ne pas utiliser de quantité excessive et éviter de laisser la solution stagner dans les plis cutanés, sous le patient, ou de goutter sur les champs opératoires ou tout autre matériel en contact direct avec le patient. Hibiwash® est inflammable. Ne pas utiliser de procédures d'électrocautérisation ni d'autres sources d'inflammation avant que le produit ait séché. Ce produit ne doit pas être utilisé pour la désinfection du matériel chirurgical. Population pédiatrique : L'utilisation de solutions de chlorhexidine, à base d'alcool et aqueuse, pour l'antisepsie cutanée avant toute procédure invasive a été associée à une irritation ou des brûlures chimiques chez les nouveau-nés. À utiliser avec précaution chez les nourrissons prématurés ou de moins de deux mois.

APRÈS LE LAVAGE AVEC HIBIWASH®

Ne pas utiliser de crèmes, poudres, huiles, produits capillaires, déodorants, parfums, maquillage, vernis à ongles, bijoux. Ils peuvent réduire l'efficacité du produit.

1. Brode L. 1976. Wound infections in clean and potentially contaminated surgery. Acta Chir Scand. 142: 191-200. 2. Gillespie B.M. 2021. Worldwide incidence of surgical site infections in general surgical patients: A systematic review and meta-analysis of 488,594 patients. Int J Surg. 2021 Nov;95:106136. 3. Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Rapport épidémiologique annuel 2016 – Infections du site opératoire [Internet]. Stockholm : ECDC; 2016. Disponible [en ligne] sur : <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/healthcare-associated-infections-surgical-site-infections-annual-0>. 4. Résumé des caractéristiques du produit (RCP) de Hibiwash. 5. Byrne DJ et al. Rationalizing whole body disinfection. Journal of Hospital Infection 1990; 15: 183-187. 6. Mölnlycke Internal Report REPR 1037. 7. Byrne DJ et al. Effects of whole-body disinfection on skin flora in patients undergoing elective surgery. Journal of Hospital Infection 1991; 17: 212-272. 8. Mölnlycke

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Suisse, téléphone : +41 44 744 54 00, email : info.ch@molnlycke.com. Le nom et le logo Mölnlycke sont des marques déposées à l'échelle mondiale par une ou plusieurs sociétés du groupe Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. 2026HQM00882CHFR

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER
www.molnlycke.com



