

Risikobewertung für chirurgische Eingriffe^{1,2}

(Surgical Side Effects - SSE)



Name des Arztes _____

Name der/des Patientin/en _____

Datum der Bewertung _____ Datum des Eingriffs _____

Operativer Eingriff _____

Risikofaktoren: zutreffende Felder ankreuzen

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Diabetes mellitus | ☐ ASA* ≥ 3 | ☐ Wundklasse II** |
| ☐ Adipositas | ☐ OP Dauer >120 Minuten | (sauber – kontaminiert) |

Risiko-Ermittlung:

Die addierten Risikofaktoren beschreiben das Risiko.

Wenn der Patient Wundklasse III oder IV oder eine Notfalloperation hat, sollte der Risikostatus des Patienten als hoch eingestuft werden, unabhängig vom Status aller anderen Risikofaktoren.

(0 oder 1 Kriterium= Mäßig, 2 Kriterien = Erhöht, 3 oder mehr Kriterien = Hoch)

Geringes bis mässiges Risiko



Produktempfehlung:
Mepilex® Border Post-Op

Erhöhtes Risiko



Hohes Risiko



Produktempfehlung:
Avance® Solo

Ergebnis: Risiko-Profil des Patienten

☐ Mäßig ☐ Erhöht ☐ Hoch

* ASA: Klassifizierungssystem für den physischen Status d. Patienten unter <https://www.asahq.org/standards-and-guidelines/asa-physical-status-classification-system>

** Kontaminationsgrad des OP-Gebiets: Mangram A & al. Guideline for prevention of surgical site infection. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999; 20 : 247-278; https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Empf_postopWI.pdf?__blob=publicationFile

Referenzen: 1. modifiziert nach SSERA Group (2023) Surgical patient population risk assessment: The simplified SSERA assessment model. Wounds International 2. www.molnlycke.com/product-support/post-op-recovery-references/

Behandlungsempfehlung:



Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.com/de-de