

SÅDAN VASKER DU HELE KROPPEN MED ANTIMIKROBIEL HIBIWASH®

BINDER SIG TIL OG PLEJER HUDEN, SAMTIDIGT MED AT DEN DRÆBER BAKTERIER.




TRIN 1: Skyl hele kroppen, og sluk derefter for bruseren.




TRIN 2: Vask ansigtet med ufortyndet Hibiwash®, især omkring næsen og undgå næsebor, øjne, mund og ører.




TRIN 3: Vask hals, arme, armhuler, underarme og hænder med nedadgående bevægelser.



TRIN 4: Fortsæt med at vaske hele kroppen, ryggen og hofterne, og vask grundigt omkring lyskeområdet/skridtet. Fortsæt derefter nedad til benene og fødderne, og vær opmærksom mellem tærne.




TRIN 5: Efter du har vasket alle disse vigtige områder, skal du skylle dig under bruseren.



TRIN 6: Gentag trin 2 til 5, men start denne gang med håret.



TRIN 7: Efter du har vasket alle disse vigtige områder, skal du skylle dig under bruseren.



TRIN 8: Efter den sidste skylning skal du tørre dig grundigt med et rent håndklæde og tage rent tøj på.



LÆS MERE PÅ WWW.MOLNLYCKE.DK

Hibiwash®
binder sig til huden



Brug ca. 25 ml Hibiwash® ved hver vask. Dæk omhyggeligt hele kroppen med Hibiwash® for effektivt at fjerne mikroorganismer.

Hibiwash® (chlorhexidindigluconat) 40mg/ml kutan opløsning. Håndkøbsmedicin. Anvendelse: Desinfektion af hænder og hud hos voksne/børn før eller efter en operation for at forebygge infektioner. Læs indlægssedlen grundigt før brug (opdateret 2025-05-09) på www.indlaegssedel.dk. Kontakt sundhedsvæsenet for rådgivning

KONTRAINDIKATIONER/MÅ IKKE ANVENDES

- Hvis du er allergisk over for chlorhexidindigluconat eller andre indholdsstoffer i Hibiwash må du ikke bruge dette lægemiddel.
- Anvend IKKE Hibiwash i øjne eller mellemøret. Hvis du ved et uheld får lægemidlet i øjnene eller ørerne, skal du straks skylle grundigt med rigeligt vand.
- Skal af sundhedspersonale ikke anvendes på nervevæv, f.eks. hjernen og hjernebinderne (membranen der omgiver hjernen og rygmarven).

ADVARSLER

- Ved øjenirritation, eller ved tegn på allergiske reaktioner, afbryd brugen og søg straks lægehjælp.
- Undgå kontakt med øjne, ører, mund og andre slimhinder.
- Kun til udvortes brug.
- Dette lægemiddel må ikke synkes.
- For patienter med hoved- eller rygmarvsskader eller perforeret trommehinde, skal fordelingen af brug ved præoperativ forberedelse afvejes mod risikoen ved kontakt med opløsningen.
- Hibiwash bør ikke anvendes til dybe og omfattende sår.
- Må af sundhedspersonale ikke injiceres eller anvendes i kropshuler.
- Sundhedspersonale skal fjerne alt gennemvædet materiale, lagner eller kåber, inden indgrebet fortsætter.
- Brug ikke for store mængder, og lad ikke opløsningen samle sig i hudfolder eller under patienten, eller dryppe på lagner eller andet materiale i direkte kontakt med patienten.
- Hibiwash er brandfarligt. Må ikke anvendes med elektrokoagulation eller andre antændelseskilder, før opløsningen er tør.
- Må ikke anvendes til desinfektion af kirurgisk materiale.
- Børn og unge: Anvend med forsigtighed til nyfødte børn, især for tidligt fødte børn, da lægemidlet kan forårsage kemiske forbrændinger.
- Må ikke anvendes sammen med anden sæbe, da det kan gøre Hibiwash mindre effektivt.

EFTER VASK MED HIBIWASH®

- Brug ikke cremer, pudder, olier, hårplejeprodukter, deodoranter, parfume, makeup, neglelak eller smykker. De kan reducere produktets effektivitet.

Med 4% chlorhexidindigluconat

1. Gillespie B.M. 2021. Worldwide incidence of surgical site infections in general surgical patients: A systematic review and meta-analysis of 488,594 patients. International Journal of Surgery, 95, p. 106136.

Mölnlycke Health Care AB, Box 6, Entreprenörstråket 21, SE-431 21 Mölndal Sverige. Tel+ 46 31 722 30 00. Varemærkerne, navnene og logoerne Mölnlycke, Hibiwash, Hibi er globalt registreret af et eller flere selskaber i Mölnlycke Health Care Group. ©2025 Mölnlycke Health Care AB. Med eneret. HQIM007945DK. Mere information findes på www.molnlycke.dk

