

Un nouveau consensus international confirme que :

Le pansement idéal pour une incision chirurgicale favorise une « cicatrisation sans perturbation » et présente un ensemble de propriétés idéales.


Résumé de la publication: Morgan-Jones R. et al. Defining excellence in incision care: Consensus from over 100 surgeons and surgical experts on the importance of undisturbed wound healing and surgical dressing properties. Global Wound Care Journal, 2025.

Quels sont les enjeux de la prise en charge des incisions chirurgicales après l'intervention?



300 million de procédures

Avec plus de 300 millions d'interventions chirurgicales réalisées chaque année dans le monde¹, la prise en charge des incisions, notamment le choix du pansement, peut avoir un impact majeur sur les résultats cliniques.



Complication des plaies chirurgicales (CPC)

Les CPS, notamment les Infections du Site Opératoire (ISO)², comptent parmi les causes les plus fréquentes d'infections associées aux soins dans le monde³ et l'on estime que jusqu'à 50% des ISO pourraient être évitées⁴.



Variation des bonnes pratiques à l'échelle mondiale

L'importance d'une cicatrisation sans perturbation pour protéger les plaies de toute contamination a été soulignée⁵, mais peu de recommandations internationales ont été publiées et les pratiques semblent varier.

Vue d'ensemble du consensus

Objectif et périmètre

Synthétiser les résultats de 12 publications, sur la base des contributions de plus de 100 chirurgiens et experts en chirurgie du monde entier.

Méthodologie

Ce consensus est issu de réunions organisées entre 2019 et 2025. Chaque réunion a donné lieu à des discussions structurées sur la prise en charge des incisions chirurgicales après l'intervention, en tenant compte des spécificités régionales.

Objectifs du consensus

À travers des échanges autour de domaines clés visant à :

- Clarifier les points de vue sur la prise en charge des incisions et le choix des pansements pour les plaies chirurgicales
- Parvenir à un consensus sur les recommandations
- S'accorder sur les propriétés du pansement « idéal »

Résultats du consensus

Principales caractéristiques du pansement « idéal » pour les incisions chirurgicales :

- Flexible et confortable
- Adhère bien à la peau
- Absorbant
- Protège la peau
- Imperméable
- Élimine l'espace "mort" entre le lit de la plaie et le pansement

Les bénéfices d'une cicatrisation sans perturbation

- La cicatrisation est optimisée lorsque la plaie reste intacte, en l'absence de raisons cliniques justifiant de la perturber
- Réduit les risques de contamination et d'infection potentielle
- Permet de réduire les coûts et le temps consacré par les professionnels de santé

Raisons cliniques justifiant le changement d'un pansement

- Saturation du pansement
- Fuite / écoulement à travers le pansement
- Saignement excessif
- Suspicion d'infection
- Altération des berges de la plaie ou désunion de la plaie
- Perte d'adhérence du pansement
- Irritation cutanée ou réaction allergique au pansement

Messages clés du nouveau consensus



1. Laisser le pansement en place aussi longtemps que possible afin de favoriser une cicatrisation sans perturbation et de réduire les coûts et le temps consacré aux soins.



2. Changer les pansements lorsque cela est cliniquement nécessaire, et non selon un calendrier prédéfini.



3. Choisir des pansements présentant les caractéristiques « idéales », qui ne risquent pas d'endommager la peau ni de limiter les mouvements.

Références: 1. Gillespie BM, Harbeck E, Rattray M et al (2021) Worldwide incidence of surgical site infections in general surgical patients: a systematic review and meta-analysis of 488,594 patients. Int J Surg 95: 106136. doi: 10.1016/j.ijsu.2021.106136. 2. Sandy-Hodgetts K, Ousey K, Conway B et al (2020) International best practice recommendations for the early identification and prevention of surgical. 3. European Centre for Disease Prevention and Control (2023) Healthcare-associated infections: surgical site infections: Annual Epidemiological Report for 2018-20. Available at: <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/healthcare-associated-infections-surgical-site-annual-2018-2020> (accessed 05.09.2025). 4. Umscheid CA, Mitchell MD, Doshi JA et al (2011) Estimating the proportion of healthcare-associated infections that are reasonably preventable and the related mortality and costs. Infect Control Hosp Epidemiol 32(2): 101-14. doi: 10.1086/657912. 5. World Union of Wound Healing Societies (2016) Closed surgical incision management: Understanding the role of NPWT. London: Wounds International.

Mölnlycke est une marque et un logo déposé au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales.

Distributeur: Mölnlycke Health Care CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex Tel: 03 20 12 25 55

Fabricant: Mölnlycke Health Care, Sweden

© Copyright (2026) Mölnlycke Health Care. 2609FRWC3314
www.molnlycke.fr

