

# CAS CLINIQUE

## HOMME DE 25 ANS

- Présentant une plaie consécutive à l'exérèse d'un kyste sous-cutané dans le sillon inter-fessier.
- Cette plaie a été traitée antérieurement avec un pansement hydrocolloïde.

# KYSTE SACRO-COCCYGIEN

AUTEUR : LYGIE-ANNE JOSPIN, IDEL, TOULOUSE

## Mepilex® Border Protect Sacrum

## ANTÉCÉDENTS DU PATIENT

- Aucun antécédent médical

## PROTOCOLE DE SOINS J+3 APRÈS EXÉRÈSE

J0 à J49

Alginat\*



Mepilex® Border  
Protect Sacrum  
22x25\*\*



Renouvellement  
tous les jours

\* pour plaie cavitaire et pour assurer l'absorption des exsudats.  
\*\* pour protéger et recouvrir la plaie; pour le confort du patient.

## EVOLUTION DE LA PLAIE

J0



- Surface de 14 cm<sup>2</sup>
- Plaie en phase de détersión
- Absence de signes cliniques d'infection locale
- Peau périlésionnelle saine
- Niveau d'exsudat faible

90%  
fibrine

10%  
bourgeonnement

J12



- Plaie en phase de détersión acquise (fibrine < 50%)
- Peau périlésionnelle saine
- Absence d'exsudat

40%  
fibrine

60%  
bourgeonnement

